



WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW

*charakterystyka choroby
i zalecenia
Inspekcji Weterynaryjnej.*



Informacja dla mieszkańców województwa podkarpackiego

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są **dzikie ptaki**, będące bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.

Objawy kliniczne grypy ptaków u drobiu są mało charakterystyczne i różnicowane w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków, zakażeń towarzyszących oraz warunków rodowiskowych.

Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja, gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękka skorupa jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwoneczków, silne świądzenie, obrzęk zatok podczochrowych, kichanie, duszność, biegunka.

Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą występować objawy ze strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja jaj u niosek. Zakażone ptaki wydają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest bezpośredni lub pośredni kontakt z innymi ptakami dzikimi, zwykle ptactwem wodnym. Rozprzestrzenienie wirusa może nastąpić również poprzez zanieczyszczone pasze, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.

Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni, zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczenia, sprzętu, nawozu oraz **dokładne ich oczyszczenie i odkażenie**. Wirusy grypy są wrażliwe na powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka termiczna (smażenie, gotowanie).

ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA OGNISKA GRYPY PTAKÓW NA TERYTORIUM POLSKI.

Informacje dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy:

Wprowadzono zakaz:

- utrzymywania kur, kaczek, gusi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bałantów i kuropatw na otwartej przestrzeni;
- przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach;
- organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
- pojenia drobiu wodę pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;
- przetrzymywania kaczek i gusi z innym drobiem.



Zaleca się:

- przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
- unikanie czyszczenia kurników wodę pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieznacznego lub nagłego, zwiększonych padnięć drobiu;
- po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
- wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
- osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu (a w takich przypadkach zachowanie ostrożności i zasad bezpieczeństwa biologicznego).



Informacje dla hodowców gołębi pocztowych:

Wprowadzono zakaz:

- organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
- przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach;

- wypuszczania gołębi z gołębników w celu oblatywania;

Zaleca się :

- przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych tych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;

Informacje dla przemysłowych producentów drobiu:

Wprowadzono zakaz:


- utrzymywania kur, kaczek, gosi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bałantów i kuropatw na otwartej przestrzeni;
- organizowania targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywych ptaków;
- przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia żywych ptaków na targowiskach;
- pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników, do których mają dostęp dzikie ptaki;



Zaleca się :

- unikanie czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
- ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób;
- ograniczenie liczby osób obsługujących fermę do koniecznego minimum wraz ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;

- rozczyszczenie przed wejściami do budynków fermy drobiu matami naszczynionymi rodkiem dezynfekcyjnym;
- założenie luz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu;
- wprowadzenie zakazu wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny;
- obowiązek dezynfekcji pojazdów wjeżdżających; rozczyszczenie matami dezynfekcyjnymi przed wjazdem i wejściami na teren fermy;



- obowiązek udrażniania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży w szatni;
- wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściami do obiektów, w których utrzymuje się drób;

- aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń może powodować wzrost zagrożenia chorob oraz konsekwencje prawne.



Inspekcja Weterynaryjna informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do rzeźni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w rzeźniach drobiu.

Inspekcja Weterynaryjna zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia ptasi gryp, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów (poddanych obróbce termicznej).